

Załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW nr R - 146/2014 z dnia 28.08.2014 r.

**Posiadacz zezwolenia:**

Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii, tel: +32 70 245 245

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

Agrosimex Sp. z o.o., ul. Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 48 66 80 481, 48 66 80 471, fax.: 48 66 80 486, e - mail: info@agrosimex.pl

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:**

Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyño, 84 – 110 Krokowa, tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89, email: info@target.com.pl, www.target.com.pl

Agrosimex Sp. z o.o., ul. Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 48 66 80 481, 48 66 80 471, fax.: 48 66 80 486, e - mail: info@agrosimex.pl

Pakon Sp. z o. o. , ul. Zakładowa 7, 62-500 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18 wew. 136, e - mail: biuro@pakon-konin.pl

Towarzystwo Chemiczne „DANMAR”, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel. 42 650 95 50, fax 42 650 66 95, e-mail: biuro@danmar.eu

## SYLLIT 65 WP

### Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

**dodyna** (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg)

**Zezwolenie MRiRW nr R - 146/2014 z dnia 28.08.2014 r.**



### Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P391 - Zebrać wyciek.

## **OPIS DZIAŁANIA**

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

## **STOSOWANIE ŚRODKA**

### **Jabłoń**

*parch jabłoni*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>**

Termin stosowania:

Zapobiegawczo: środek stosować od fazy pęknięcia pąka (BBCH 01) do 60 dni przed zbiorem.

Interwencyjnie: środek stosować do 24 godzin po infekcji w przypadku wysokiej temperatury i do 48 godzin w przypadku niskiej temperatury.

W celu uniknięcia ordzawień na odmianach wrażliwych (np. Golden Delicious) nie stosować środka w trakcie kwitnienia i do dwóch tygodni po kwitnieniu.

Zalecana ilość wody: **5 – 15 l/100 m<sup>2</sup>**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **4**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **7-10 dni**

### **Grusza**

*parch gruszy*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>**

Termin stosowania:

Zapobiegawczo: środek stosować od fazy pęknięcia pąka (BBCH 01) do 60 dni przed zbiorem.

Interwencyjnie: środek stosować do 24 godzin po infekcji w przypadku wysokiej temperatury i do 48 godzin w przypadku niskiej temperatury.

Zalecana ilość wody: **5 - 15 l/100 m<sup>2</sup>**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **4**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **7-10 dni**

### **Wiśnia**

*drobna plamistość liści.*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 g/100 m<sup>2</sup>**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 g/100 m<sup>2</sup>**

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 60) do 2 tygodni przed zbiorem (BBCH 79) i po zbiorze.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **4**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **7-10 dni**

Zalecana ilość wody: **5 - 15 l/100 m<sup>2</sup>**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste**

### **Brzoskwinia**

*kędzierzawość liści brzoskwini.*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 13 g/100 m<sup>2</sup>**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 13 g/100 m<sup>2</sup>**

Termin stosowania:

Środek stosować nie później niż 75 dni przed zbiorem: od fazy pęknięcia pąka (BBCH 01) do fazy opadnięcia płatków (BBCH69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **7 - 10 dni**

Zalecana ilość wody: **5 – 15 l/100 m<sup>2</sup>**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste**

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ**

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

### **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

#### **Środki ostrożności dla osób stosujących środek:**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

#### **Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 14 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

**Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:**

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

**Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):**

Jabłoń, grusza	- 60 dni
Wiśnia	- 14 dni
Brzoskwinia	- 75 dni

**Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):**

Nie dotyczy

**Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:**

Nie dotyczy

**WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w suchych, chłodnych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

**PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności	- 2 lata
Data produkcji	-
Zawartość netto	-
Nr partii	-